

DAYWHITE ACP, NITEWHITE ACP

Produse de albire pentru acasa **Instructiuni de utilizare pentru pacienti**

Trusele de albire pentru acasa permit pacientilor sa-si albeasca dintii printr-un procedeu simplu, sigur si rapid.

1. CONTINUT

- Folii de gutiere din material EVA
- Seringi cu gelul de albire
- Varfuri de mixare refolosibile
- Cutie suport gutiere
- Instructiuni pacient & dentist
- Cheie culori

Seringile sunt disponibile in 2 marimi:

- Unidoza 1.3 ml pentru 1 aplicare
- Multi-doza 2.4 ml pentru 3 aplicari

Nota: Seringile din trusa NW Turbo sunt doar multi-doza, adica 2.4 ml pentru 4 aplicari

2. INDICATII

Gelul de albire din trusa se foloseste la deschiderea nuantei dintilor colorati. DayWhite este pentru utilizare mai scurta in timpul zilei, iar NiteWhite pentru utilizare mai lunga pe timp de noapte. Produsul poate fi aruncat doar de catre sau la sfatul medicului dentist. Inainte de tratamentul de albire se recomanda programarea la un medic stomatolog pentru a va asigura ca nu exista probleme de sanatate orala.

3. CONTRAINDICATII

Cercetarile curente nu au evaluat posibilele efecte ale albirii asupra tuturor categoriilor de pacienti. Discus Dental recomanda ca urmatoarele persoane sa consulte un medic generalist inainte de tratamentul de albire:

- Femeile gravide si cele care alapteaza
- Persoanele care sunt tratate pentru anumite boli grave, de ex. SIDA
- Copiii sub 13 ani

4. INSTRUCIUNI DE PRIM-AJUTOR

- In caz de probleme, contactati imediat un medic
- Daca inghititi o cantitate mai mare de gel de albire (peste 25% din seringă), beti apa imediat si contactati n medic
- Daca inghititi gelul, nu induceti voma.
- Daca gelul intra in ochi, tineti ochii deschisi si stati cu ei sub jet de apa continua cel putin 15 minute.
- Daca gelul intra in contact cu pielea, hainele sau parul, indepartati hainele, repsectiv spalati parul, pielea cu apa.

5. RECOMANDARI DE SIGURANTA

- Purtati echipamente si ochelari de protectie.
- Nu lasati la indemana copiilor.

6. PRECAUTII

- Evitati expunerea dintilor cu sensibilitate cunoscuta sau cu cavitati mari la actiunea gelului.
- Asteptati 2 saptamani dupa albire, pentru a incepe tratamentele de restaurare.
- Nu supraincarcati gutierele cu gel pentru ca puteti irita gingia.
- Depozitati gelul ramas in locuri uscate, racoroase. Nu refrigerati.
- Nu folositi nici un alt produs pentru albirea dintilor.

7. INSTRUCIUNI PENTRU APLICARE

- Spalati-va pe dinti si folositi ata dentara.
- Cu o rasucire in sens invers acelor de ceasornic desurubati capacul de plastic transparent al seringii.
- Insurubati in sensul acelor de ceasornic varful de mixare pe siringa.
- Aplicati o cantitate mica de gel pe fiecare compartiment de dinte din gutiera (fig.1). Picatura din imagine reprezinta cantitatea medie de gel pe care trebuie sa o aplicati in functie de marimea dintelui.



Important: Supraincarcarea gutierelor cu gel poate determina iritarea temporara a gingiei.

- Introduceti gutiera cu gel in gura (fig. 3) avand grija sa nu iasa gelul din gutiera. Aparitia bulelor in gutiera este normala.
- Fiti foarte atenti sa nu ajunga gel pe gingie. Indepartati excesul de gel cu un burete de vata sau o periuta de dinti uscata.
- Dupa aplicarea gelului in gutiera, indepartati varful de mixare de pe siringa si puneti inapoi capacul de plastic. Astfel va asigurati ca cele doua componente a le seringii duale raman separate pentru eficacitate maxima.
- Dupa tratamentul de albire, clatiti gutierele cu apa rece. Cu o periuta de dinti indepartati gelul rezidual. Asezati gutiera in cutia aferenta si depozitati intr-un loc racoros si ferit de lumina.
- Clatiti si periatii dintii pentru a indeparta excesul de gel.

Nota:

- Nu mancati, nu beti, nu fumati in timp ce purtati gutiera.
- Este normal sa vedeti culori inchise in gutiera daca aveti obturatii de amalgam.
- Albirea suprafetelor apropiate de gingii dureaza mai mult, decat muchiile. Va ramane si cea mai intunecata parte a dintilor.

8. DURATA TRATAMENTULUI

Concentratie	Timp de purtare recomandat
NiteWhite ACP	Peste noapte sau 4-6 ore
10%, 16%, 22% (CP), Turbo 6% (HP)	Rezultate optime in 1-2 saptamani
DayWhite ACP	Pe timp de zi

7.5% & 9.5% (HP)
38% (CP)

30 de minute de 2x/zi
15 minute de 2x/zi

Rezultate optime in 2 saptamani

CP: peroxid de carbamida, HP: peroxid de hydrogen

9. ASTEPTARI SI REZULTATE OPTIME

Rezultatele difera in functie de pacient si depend de varsta, anatomia, conditia dintilor, igiena orala si nuanta initiala.

- Asteptarile dvs. trebuie sa fie realiste. Cu ajutorul cheii de culori identificati nuanta initiala si cea de dupa albire.
- Tineti cont de faptul ca fatetele, coroanele, obturatiile si protezele nu se albesc in urma tratamentului si trebuie inlocuite dupa albire.
- Nuanza finala se va stabili la 2 saptamani dupa albire.
- Daca nu sunteti multumiti cu rezultatul dupa 2 saptamani, contactati dentistul pentru un nou tratament.

MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU
CABINETE STOMATOLOGICE ȘI LABORATOARE DENTARE

www.poka.ro

TEHNODENT POKA SRL- RO1813923, J35/2284/1991-Sediul Central: România-Ghiroda, str. Aeroport, nr. 90, cod 307200, tel./fax: +40.256.246.114, +40.256.206.453, comenzi@poka-dent.ro